



عنوان: بررسی خصوصیات رویشی و زایشی خانواده‌های  
Solanaceae (چتریان) (umbelliferae) Apiaceae  
و Boraginaceae (گاوزبان)

University of Isfahan  
Biological Science and Technology  
Department of Plant and Animal Biology  
Farzaneh Forouharfar

## مقدمه

از زیر رده Rosidae، راسته Apiaceae یک خانواده دیگر بنام (چتریان) و از زیر رده Asteridae، راسته Solanaceae خانواده Solanales و خانواده Lamiales از راسته Boraginaceae بررسی می‌شوند.


### ۱- خانواده (چتریان) **Apiaceae** (Umbelliferae)

یک یا چند ساله بندرت بوته‌ای یا درختچه‌ای هستند برگ‌ها متناوب بندرت متقابل یا فراهم. ساده تا چندین بار منقسم خاردار یا بدون خار، یک تا چند بار شانه‌ای و برگ اغلب رشد کرده و به شکل غلاف درآمده. گل آذین معمولاً چتر مرکب یا چتر ساده. نر ماده یا تک جنس. کاسبرگ وجود دارد یا ندارد و گاهی نامساوی، گلبرگ ۵ تایی به رنگ‌های سفید، زرد، زرد متمایل به سبز، آبی کم رنگ یا ارغوانی.

پرچم‌ها ۵ تایی. تخمدان زیرین و دو خانه‌ای دو برچه‌ای و خامه دو تایی. میوه خشک دارای ۲-۱ برچه به پشت یا به پهلو فشرده شده.

نمونه‌های این خانواده بسیار وسیع و گسترده هستند که می‌توان از Anethum Zosmia Scandix نام برد.





## *Apiaceae(Umbelliferae)*



## ۲-خانواده Solanaceae (سیب زمینی)



Anthers connivent.

گیاهان این خانواده علفی بوته‌ای یا درختچه‌ای هستند و فرم‌های بالا رونده و پیچان دارند و بندرت درختی‌اند برگ‌ها تقریباً متقابل، کامل، لوب دار تا شانه ای بریده. گل آذین گرزن. گلها اغلب نر ماده غالباً منظم ۵ تایی کاسبرگها پیوسته. گلبرگها پیوسته، پرچمها ۴-۵ تایی به لوله جام گل متصل.

تخدمان فوقاری (۳-۵) ۲ خانه‌ای کلاله دو شاخه. میوه کپسول یاسته.  
از جنس‌های این خانواده *Solanum*, *Datura*, *Petunia* می‌باشند.

## ۳-خانواده Boraginaceae (گاو زبان)



فرزانه فروهرفر

گیاهانی یک تا چند ساله‌اند بندرت درختی یا درختچه‌ای و غالباً دارای کرک‌های گوناگون. برگ‌ها متناوب، ساده و دارای کرک‌های زبر (ریش مانند). گل آذین گرزن ساده یا مرکب (دم عقربی یا بادبزنی) بندرت پانیکول کاسبرگها ۵ بخشی اغلب دائمی. گلبرگها ۵ عدد پیوسته و منظم بندرت نامنظم. پرچمها ۵ تایی و رو گلبرگی (Epipetalas) تخدمان فوقاری ۴ و یا به ندرت ۲ خانه‌ای. خامه بن تحتانی (Gynobasic) و بندرت انتها یی. میوه معمولاً ۴ فندقه.

از جنس‌های این خانواده *Anchusa*, *Echium*, *Onosma* می‌باشند.



Anther connivent

*Solanaceae*



longitudinal  
section

فرزانه فروهرفر



*Heliotropium*



*Boraginaceae*



Inflorescences of helicoid cymes.

## روش کار

نمونه‌های گیاهی از خانواده‌های فوق را تحویل گرفته و پس از مشاهده خصوصیات ظاهری و یادداشت آنها با استفاده از لوب مشخصات میکروسکوپی را بررسی نمائید. گلهای نمونه‌ها را در آب جوشانده تا بافت نرم و اندامها قابل تشخیص شوند.

اختشاصات رویشی از قبیل فرم رویش، شکل و آرایش برگها و زایشی از قبیل نوع گل آذین تک جنس یا دو جنس بودن گلها تعداد قطعات گل و موقعیت تخدمان را یادداشت کنید و سپس با استفاده از کلید نمونه‌های مختلف را شناسایی کنید.

# پرسش و فعالیت

۱. خصوصیات کلیدی مربوط به هر خانواده را بنویسید.

۱- خانواده Apiaceae

۲- خانواده Solanaceae

۳- خانواده Boraginaceae

۲- جدولی در رابطه با جنس‌های مختلفی که مشاهده کردید تهیه و خصوصیات هر نمونه را یادداشت کنید. (با توجه به آنچه که در جلسات گذشته مورد ارزیابی قرار دارید جدول را تنظیم کنید.

خانواده	جنس

۳-تفاوت جنس‌های مختلف را در خانواده Boraginaceae بصورت کلی بنویسید.

۴-خصوصیات ویژه هر خانواده را بنویسید.

۵-شکل نمونه‌های مورد بررسی را رسم و خصوصیات رده‌بندی آنها را یادداشت کنید.